



TUBEROZADE HOGHILAG

**ASOCIAȚIA
„CENTRUL DE
EXCELENȚĂ
PENTRU
PROMOVAREA
COMUNEI
HOGHILAG”**

INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ



Grupul aplicant:
ASOCIAȚIA
**„CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
PROMOVAREA COMUNEI HOGHILAG”**
Comuna HOGHILAG sat Hoghilag nr.34-
35 Jud.Sibiu
Mobil: +40 741 992699
mail:aceho.sibiu@gmail.com

INDICATIE GEOGRAFICA PROTEJATA



Produs cu indicație geografică protejată.


IGP - "indicația geografică protejată": poate fi numele unei regiuni, unui loc specific sau al unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar. Produsul trebuie să fie: - originar din aceasta regiune, loc specific sau țară, - să posede o calitate specifică, reputație sau alte caracteristici atribuite originii geografice, - **materiile prime folosite pot să provină și din afara ariei geografice definite**, - anumite operații ale procesului de producție cum ar fi ambalarea, congelarea, depozitarea, etc. pot avea loc în afara ariei geografice definite.



Legenda spune că bulbii florii au fost aduși în Europa, din Mexic, de către un călugăr misionar franciscan, ce i-a cultivat în secret în curtea unei manastiri din Toulon.

Această floare ne-a rămas moștenire de la etnicii germani, sașii, care au colonizat partea de sud a imperiului austro - ungar, în vederea întăririi granițelor. Sașii o cultivau pentru parfumul ei amețitor, afodisiac și pentru uleiurile esențiale ce se extrăgeau din aceasta.

TUBEROZA DE HOGHILAG



TUBEROZA DE HOGHILAG

Tuberozele infloresc neuniform, din iulie pana in octombrie. O particularitate a acestor specii o constituie faptul ca numai 25-50% din bulbii plantati formeaza flori, chiar in conditii foarte bune de cultura.

Soiurile cultivate se deosebesc prin forma florilor si talia plantelor:

- Perla- un soi cu flori involte, albe, cu aspect ceros. Inflorescenta scurta, cu florile apropiate, tija de 70-80 cm
- Fiorentina- flori duble, albe, parfumate, mai distantate pe rahis. Tija inalta pana la 100 cm.
- Albino- soi cu numeroase flori simple, albe.
- Silver leaf- cu flori simple, albe ca zapada. Ultimele doua soiuri se cultiva in unele tari pe suprafete mari, pentru industria parfumurilor.

Particularitati agrobiologice



Aceasta specie se caracterizeaza prin aceea ca bulbii principali nu infloresc toti in cursul aceluasi an, iar cei care au inflorit o data isi pierde aceasta calitate. De asemenea, procentul de inflorire este mic, de circa 25-50% indeosebi cand cultura se face in teren deschis. In cadrul unui experimentelor , prin administrarea de superfosfat granulat in cantitate de 60 g/metru patrat si fosforbacterin dat prin mocirlirea bulbilor plantati pe un agrofond cu ingrasaminte organice (mranita 5 kg/m patrat) s-a realizat un procent de 75% plante inflorite.

Specificitatea T de H este procentul de inflorire, de aprox 95% , ceea ce demonstreaza faptul ca la H au conditii de echilibru perfect dpv pedoclimatic si al tehnologiei de cultura

DELIMITAREA ARIEI GEOGRAFICE



Aria geografica stabilita pentru cultivarea Tuberozei de Hoghilag este intreg teriroriul administrative al UAT comuna Hoghilag, cu cele trei sate apartinatoare, Hoghilag, Valchid si Prod. Hoghilag (în dialectul săsesc Halwelajen, Halvelâjn, în germană Halvelagen, Halwelagen, în maghiară Holdvilág, Nagyholdvilág) este o comună în județul Sibiu. Comuna este situată la 80 km de municipiul Sibiu și la 2 km de orașul Dumbrăveni, pe DJ 142 E si 2 km pana la DN 14. Cea mai veche atestare documentară a localității este într-un document din 1335, care se referă la un preot, pe nume Johanes, din Archidiaconatul Târnavei.

La 2 km de vatra satului Hoghilag trece magistrala feroviară București-Brașov-Cluj-Napoca Oradea/Episcopia Bihor (magistrala 300). Altitudinea medie a dealurilor prezente pe teritoriul comunei este de 300-350 m. Suprafața teritoriului comunei este de 5.213 ha.

Localitățile cu care se învecinează comuna Hoghilag sunt:

Nord– comuna Viișoara

Est– comuna Laslea

Sud– sat Copșa Mare


Vest– orașul Dumbrăveni

DOVADA ORIGINII PRODUSULUI IN ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

In monografia din 1998, publicata in limba germana la Munchen, cu titlul Hoghilag acolo a fost casa mea, publicată de Anna Dengel și Ulrike Schinkercu mandatul și sprijinul comunității săsești a Hoghilagului tradusa de Mihai Florea si editura asociației sașilor din Transilvania la pagina 109 regasim foarte clar faptul ca locuitorii comunei de etnie saseasca practicau cultivarea tuberozei.

Florile au fost întotdeauna iubite și cultivate în Hoghilag. Datorită vecinătății de piața săptămânală din Dumbrăveni, femeile cultivau florile nu numai pentru decorarea propriei case și curți, ci și pentru a le comercializa aducând bani suplimentari în familie.

Cea mai cunoscută floare, cultivată în satul nostru și vândută la Timișoara, Brașov, Ploiești și București, a fost tuberoza aromată, originară din zona Mării Mediterane - devenită "Tuberoza de Hoghilag". Această floare s-a cultivat intens până la plecarea noastră în Germania și ne-a adus mari venituri.;Astăzi practică a fost preluată de locuitorii români din Hoghilag.



Instantanee foto realizate in gradinile cu tuberoze

Floricultura

DOVADA ORIGINII PRODUSULUI IN ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

PRODUSUL	ANUL	
	Trim. III iul-aug-sept	Trim. IV oct-nov-dec
Carte	200	
Brucii	1000	
Corbuzi	200	
Tomate	40	
Varza	300	
14 Suroze	1000	
Flori de Vale	1000	
Capste	300	

TUBEROZA DE HOGHILAG

Strada				Nr. casei		Categoria de gospodărie		Cod	
2				3		4		5	
				314		Individuală			

Semnătura declarantului									
1992									
1993									
1994									
1995									
1996									
1997									

1. Componenta gospodăriei						Data nașterii		Studii	Ocupația	Locul de muncă	Mențiuni
Numele și prenumele membrilor gospodăriei		Sexul (M sau F)	Situația față de capul gospodăriei	Anul	Luna	Ziua					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NTEAN EMIL M			Capul gospodăriei	1940	03	15	sc tehnica part				
NTEAN FLOAREA F			soția	1942	10	03	12 cl. secretar Primarie				
NTEAN E. LUMINITA F			fata	1969	06	14	12 cl. învățătoare Șc. b-vnu				
NTEAN C. EMILIA F			fata	1971	03	09	12 cl. a educatoare grădiniță				
IOANA F											
FLORICA											

Cap. 2. Terenuri în proprietatea gospodăriei						Cap. 3. Suprafața cultivată					
— ha —						— ha —					
1992						1992					
1993						1993					
1994						1994					
1995						1995					
1996						1996					
B						B					
abil-total						Orz + secară					
n care : irigat						Orz + orzoaică					
suri naturale						Ovăz					
inețe naturale						Porumb					
il						Fasole					
livezi						Floarea-soarelui					
teren agricol						Săcică de zahăr					
— total —											
Teren forestier											
Alte terenuri											
— total —											
din care :											
culti și clădiri											
Suprafața totală											

Cap. 4. Pomi fructiferi (din masiv și rădălii)						Cap. 5. Identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea gospodăriei					
— bucăți —						— ha —					
1992						1992					
1993						1993					
1994						1994					
1995						1995					
1996						1996					
B						B					
Numărul total al pomilor fructiferi						Arbusti fructiferi					
Total						Căpșuni					
Meri						Vie altoită și înfrunzită cu rod					
						Vie înfrunzită cu rod					



Noaptea TUBEROZELOR

Tur ghidat 19:00-20:30

Ateliere creative, activități copii

Degustări de vin

Producători locali

Povești cu și despre flori

Cu participarea Fanfarei din Turnisor - Sibiu

6 August 2016

în curtea Bisericii Evanghelice Hoghilag

începând cu orele 18:00

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE

Încă de toamnă, se pregătește terenul pentru viitoarea cultură prin administrarea de îngrășăminte naturale, gunoi de grajd sau mranită, sau îngrășăminte chimice pe bază de NPK (azot-fosfor-potasiu) și aratură. În luna aprilie se pregătește solul, se erbicidează, se pregătește patul germinativ prin grăpare, frezare, marunțire, apoi se face marcarea terenului și se trasează rigolele. Distanțele de plantare sunt aproximativ (20-25 centimetri) între rânduri, 15-20 de centimetri pe rând și în funcție de mărimea bulbului 8-10 centimetrii adâncime.



Lucrările de îngrijire în cursul vegetației constau în prasire, administrarea de îngrășăminte faziale pe baza macroelemente (NPK) și microelemente (Bo, Cu, Fe, Mo, Zn etc.), acestea conferindu-i plantei un grad mai mare de rezistență la boli, dăunători și stres. Planta este atacată în mod special de putregaiuri, fapt pentru care, mai trebuie făcute tratamente cu fungicide. Se folosesc insecticide pentru combaterea Tripsului Californian și a paduchilor ce deteriorează floarea, iar împotriva stresului se folosesc stimulatori de creștere. Un alt dăunător, foarte periculos, pe care nu îl putem combate sunt păsările care ciupesc bobocii de pe tijă, care se necrozează și se va distruge întreaga floare.

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE

Creșterea mirobolantei tuberoze se poate face atât liber, cât și protejat, în solaria mici sau tip tunel.

În creșterea liberă, a florii pot spune că acestea sunt mai rezistente la păstrare, rozul bobocilor și mirosul este mai intens, cele protejate au culoare alburie și sunt mai sensibile la factorii de mediu.

Soiurile cultivate în România sunt LA PERLA, în comuna Hoghilag și LA FLORENTINA în sudul țării. Diferența între cele două soiuri cu toate avantajele inspre LA PERLA este parfumul mult mai puternic, prezența culorii roz la nivelul bobocilor, iar floarea este mai bogată.



Inflorirea are loc în lunile iulie pentru cele protejate și august – septembrie pentru cele neprotejate. Datorită mirosului imbătător și a perioadei de inflorire ce coincide aproximativ cu sărbătoarea Sfintei Marii, TUBEROZA, mai este numită și floarea Maicii Domnului.

Recoltarea și comercializarea florilor se face în prezent în cantități variabile, la mică înțelegere, între producători și intermediari sau florari, acestea luând drumul piețelor din marile orașe ale țării, unde sunt la mare căutare. Prețul florilor respectă principiul economiei de piață cerere-ofertă

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE

Urmează recoltarea bulbilor, după două brume, în lunile septembrie-octombrie, aceștia se scot din pământ, cu furci speciale, se adună și se curăță de frunze și rădăcini.

Apoi bulbii se desprind de bulbii mamă, selectându-se în funcție de mărime și vârstă. Următoarea etapă este uscarea în strat subțire a acestora până la apariția temperaturilor scăzute, când, se vor depozita, în ladite, în camerele de păstrare, care trebuie să asigure o temperatură de 15-20 grade Celsius. În funcție de păstrarea corespunzătoare a bulbilor și bulbilor în timpul iernii depinde înrădăcinarea acestora după plantare, premisă necesară unei viitoare flori sănătoase și frumoase.



Scăldat în soare și miros de tuberoze, în luna august Hoghilagul este în sărbătoare, în primul weekend are loc festivalul Tuberozelor.

Încă din 2016, comuna Hoghilag este vizitată, la festival de un număr remarcabil de oaspeți din țară și străinătate, iubitori de flori, care colindă grădinile înmiresmate de tuberoze. Sunt interesați de tehnologia culturii acestei plante, de istoricul și legendele țesute de-a lungul veacurilor în care primadona este TUBEROZA.

VERIFICAREA RESPECTĂRII CAIETULUI DE SARCINI

Denumirea: SC CERTIND S.A.

Adresa: București, Sector 1, str. George Enescu nr. 27-29 – "Palatul UGIR 1903"

Date de contact: tel/fax: 021 133 651

e-mail: office@certind.ro

website: www.certind.ro



NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA SI ETICHETAREA

- Produsul se comercializeaza in buchete legate la baza

Pe etichetă se va scrie:


- Numele produsului „Tuberoza de Hoghilag ” urmat de mențiunea „Indicație Geografică Protejată” sau acronimul „IGP” (tradus în limba țării în care este comercializat produsul);
- Numele și adresa producătorului;
- Însemnele Organismului de Inspecție și Certificare.





Prima și singura platformă independentă pentru
măsurarea calității aerului din jud. SIBIU
#RespirăLiber



Humidity



Temperature



CONTACT

Pentru întrebări sau
orice altceva sub soare

Email

ionut.diaconeasa@gmail.com

Phone number

0749839734

